

Soort	Specifiek	Merknaam	Stoppen	Herstarten	Extra info
1. Plaatjesremmers					
	acetylsalicylzuur	Aspirine®, Aspro®, Acetylsalicylzuur®, Asaflow®	Niet		
	dipyridamol	Persantin®, Dypiridamol®	Niet		
	NSAID's		Niet		
	COX2 selectieve	Arcoxia®, Celebrex®	Niet		
	metamizol	Novalgine®	Niet		
	SSRI's		Niet		
	clopidogrel	Plavix®	4dagen	Na 7u	Cardiologisch advies vereist
	prasugrel	Efient®	4dagen	Na 7u	Cardiologisch advies vereist
	ticagrelor	Brilique®	4dagen	Na 7u	Cardiologisch advies vereist
	ticlopidine	Ticlid®	7 dagen	Na 7u	Cardiologisch advies vereist
	abciximab	Reopro®	48u	Na 8u	Cardiologisch advies vereist
	eptifibatide	Integrilin®	8u	Na 8u	Cardiologisch advies vereist
	tirofiban	Aggrastat®	8u	Na 8u	Cardiologisch advies vereist
2. Anticoagulantia					
Coumarinederivaten					
Vitamine K-antagonisten					
	acenocoumarol	Sintrom®	3 dagen, INR<1,5	Na procedure, zo bloederig pas na 24u herstarten	INR bepalen vooravond/dag van inspuiting Vervangen door Fraxodi 171 E/kg per dag
	fenprocoumon	Marcoumar®	7 dagen, INR <1,	Na procedure, zo bloederig pas na 24u herstarten	INR bepalen vooravond/dag van inspuiting Vervangen door Fraxodi 171 E/kg per dag
	warfarine	Marevan®	5 dagen, INR<1,5	Na procedure, zo bloederig pas na 24u herstarten	INR bepalen vooravond/dag van inspuiting Vervangen door Fraxodi 171 E/kg per dag
Heparine & derivaten					
LMWH					
	enoxaparine	Clexane®	Profylactisch: 10u Therapeutisch: 24u	Profylactisch: na 4u Therapeutisch: na 24u, evt intussen wel profylactisch	
	nadroparine	Fraxiparine®, Fraxodi®	Profylactisch: 10u Therapeutisch: 24u	Profylactisch: na 4u Therapeutisch: na 24u, evt intussen wel profylactisch	
	daltaperine	Fragmin®	Profylactisch: 10u Therapeutisch: 24u	Profylactisch: na 4u Therapeutisch: na 24u, evt intussen wel profylactisch	
	fondaparinux	Arixtra®	Profylactisch: 36u Therapeutisch: absolute C.I.	Profylactisch: na 6u, zo bloederig pas na 24u	Profylactisch: switch naar LMWH zolang catheter
	danaparoide	Orgaran®	Absolute C.I.		
Ongefractioneerde heparine					
		Heparine Leo®, Heparine Na®	Profylactisch (SC): 4u Therapeutisch (IV): 4u	Profylactisch: na 1u, zo bloederig na 4u Therapeutisch: na 24u	Profylactisch: maximaal 2x5000IU/d sc
Factor Xa remmers					
	rivaroxaban	Xarelto®	48u bij normale nierfunctie, 72u bij gestoorde nierfunctie	Na 8u	Nierfunctie via labo
	apixaban	Eliquis®	48u bij normale nierfunctie, 72u bij gestoorde nierfunctie	Na 8u	Nierfunctie via labo
Thrombine inhibitoren					
	dabigatran	Pradaxa®	48u bij normale nierfunctie, 72u bij gestoorde nierfunctie	Na 8u	Nierfunctie via labo
3. Thrombolytica					
		Actilyse®, Urokinase®	Absolute C.I.		Wacht 10 dagen na fibrinolyse

Bij lumbale therapeutische facetinfiltraties en triggerpuntinfiltraties dienen anticoagulantia niet gestopt te worden.

***Deze richtlijnen zijn gebaseerd op "Richtlijnen neuraxisblokkade & antistolling 2014" door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en opgesteld in overleg met de dienst cardiologie.